

Behandeling bij per ongeluk intra-arteriële injectie van aethoxysclerol

1. Naald laten zitten (indien mogelijk) en breng een infuus in
2. Heparine 5000 IE onmiddellijk (via de naald of anders i.v.); herhalen na 6 uur en vervolgens gedurende 2-5 dagen 5000 IE elke zes uur
3. Di-Adreson F 50 mg i.v. eenmalig
4. Waarschuw de vaatchirurg voor overleg over het verdere beleid
5. Ketensin (ketanserine) 5 mg i.v. per bolusinjectie
(patiënt plat leggen i.v.m. kans op hypotensie)
eventueel na 10 minuten herhalen tot maximaal 30 mg
vervolgens 2-6 mg/uur per infuus of 2 dd 20 mg per os continueren
(1 ampul ketanserine van 50 mg in tenminste 100 ml NaCl 0.9% oplossen)
6. Pijnstilling op geleide van de pijn
7. NaCl 0.9% 2 liter per 24 uur
8. Klinische observatie (opname)
eventueel intraveneuze prostaglandinen of vaatchirurgische interventies

Medicatie:

Heparine Leo 5000 IE ampul à 5 ml
Di-Adreson F 25 mg/ml; ampul à 1 ml - 2 ampullen
Ketensin 5 mg/ml ampul à 10 ml

bron: Neumann HAM. Leerboek flebologie. Utrecht, Lemma BV, 2003: p 379.

- aangepast in overleg met afdeling vaatchirurgie AMC
- dextrans verwijderd uit het oorspronkelijke protocol (uit de handel)

datum: 26 maart 2012