

Behandeling bij per ongeluk intra-arteriële injectie van aethoxysclerol

1. Naald laten zitten (indien mogelijk) en breng een infuus in
2. Heparine 5000 IE onmiddellijk (via de naald of anders i.v.); herhalen na 6 uur en vervolgens gedurende 2-5 dagen 5000 IE elke zes uur
3. Di-Adreson F 50 mg i.v. eenmalig
4. Waarschuw de vaatchirurg voor overleg over het verdere beleid
5. Pijnstilling op geleide van de pijn
6. NaCl 0.9% 2 liter per 24 uur
7. Klinische observatie (opname)
eventueel intraveneuze prostaglandinen of vaatchirurgische interventies

Medicatie:

Heparine Leo 5000 IE ampul à 5 ml
Di-Adreson F 25 mg/ml; ampul à 1 ml - 2 ampullen

bron: Neumann HAM. Leerboek flebologie. Utrecht, Lemma BV, 2003: p 379.

- aangepast in overleg met afdeling vaatchirurgie AMC
- dextran verwijderd uit het oorspronkelijke protocol (uit de handel)
- het oorspronkelijke protocol noemt ook als vijfde stap i.v. ketanserine als vaatverwijder
Ketanserine is echter uit de handel sinds 2020.

datum: 11 november 2021