

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER**Canesten[®] gyno tablet**

Canesten gyno tablet, tablet voor vaginaal gebruik 100 mg

Werkzaam bestanddeel: clotrimazol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel dus niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter:

1. Wat is Canesten gyno en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Canesten gyno tablet gebruikt
3. Hoe wordt Canesten gyno tablet gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Canesten gyno tablet?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CANESTEN GYNO TABLET EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Canesten gyno tablet bevat de werkzaam stof clotrimazol. Clotrimazol is een stof, die bepaalde schimmels doodt of in de groei remt. Canesten gyno tablet is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, tenzij uw arts anders adviseert.

Canesten gyno tablet wordt toegepast bij infecties van de vagina of hiermee gepaard gaande infecties rond de vagina, die veroorzaakt worden door bepaalde schimmelsoorten. De meest voorkomende veroorzaker van een schimmelinfectie is *Candida albicans*. Deze schimmel is normaal op de huid aanwezig maar kan onder bepaalde omstandigheden klachten veroorzaken, zoals het ontstaan van vaginale afscheiding, bekend als witte vloed.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CANESTEN GYNO TABLET GEBRUIKT

Gebruik Canesten gyno tablet niet

Bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof clotrimazol of de andere bestanddelen van de tablet.

Raadpleeg uw arts als u denkt dat u overgevoelig bent voor clotrimazol of één van de andere bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Canesten gyno tablet

Bij gebruik van rubberproducten zoals condooms en pessaria omdat Canesten gyno tablet de werking en veiligheid hiervan kunnen verminderen. Het effect is tijdelijk, alleen tijdens de behandeling.

Bij voorkeur niet tijdens de menstruatie gebruiken, omdat dan niet helemaal op de werkzaamheid kan worden vertrouwd. Zorg er daarom voor dat de kuur vóór die tijd is beëindigd.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen van dit product met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Canesten gyno tablet kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het gebruik van de applicator moet dan worden vermeden. Behandeling met Canesten gyno tabletten verdient dan de voorkeur. De tabletten kunnen met de hand worden ingebracht.

Canesten gyno tablet kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

3. HOE WORDT CANESTEN GYNO TABLET GEBRUIKT?


Volg bij het gebruik van Canesten gyno tablet nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Het voorschrift van de arts zal in het algemeen zijn:

Gedurende zes opeenvolgende dagen eenmaal per dag - 's avonds vóór het slapen gaan - één Canesten gyno tablet zo diep mogelijk in de vagina inbrengen.


Gebruiksaanwijzing (volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar)

Het inbrengen van Canesten gyno tablet kan het beste in rugligging plaatsvinden, met enigszins opgetrokken en gespreide benen.




De applicator wordt gebruikt om de tablet zo diep mogelijk in de vagina in te brengen, bij voorkeur voor het slapen gaan. Was uw handen voordat u de vaginale tablet en de applicator uit de verpakking haalt en nadat u de applicator heeft gebruikt. Canesten gyno *vaginale tablet* wordt als volgt toegediend:


Toediening met behulp van de bijgeleverde applicator



1. Haal de applicator uit de verpakking en trek het staafje tot de rode vergrendeling uit.
2. Plaats de vaginale tablet in het open uiteinde van de applicator met de bolle kant van de vaginale tablet naar beneden. Duw op het staafje en vergrendel de applicator totdat het klikt.



3. Daarna verwijdert u de vergrendeling van het staafje en plaatst u de applicator voorzichtig in de vagina tot de inkeping




4. Houd de applicator vast bij de inkeping en duw om de vaginale tablet in te brengen het staafje voorzichtig helemaal naar binnen tot hij niet meer verder kan.



5. Haal na gebruik, de onderdelen uit elkaar en was ze grondig in warm (niet kokend) zeepwater. Spoel ze 30 seconden af met schoon water en veeg de onderdelen zorgvuldig af. Bewaar het op een schone en veilige plaats. Voor hergebruik, zorg ervoor dat de rode vergrendeling op het staafje wordt teruggeplaatst en herhaal het proces vanaf stap 2. Gooi de applicator na het laatste gebruik weg op een veilige plek, buiten het bereik van kinderen. De applicator mag niet door het toilet worden gespoeld.

Toediening zonder applicator

Houd de schaamlippen met de vrije hand uit elkaar en druk de tablet met de bolle kant naar boven en de vinger tegen de platte kant van de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de vagina naar binnen.

**Hoe lang moet Canesten gyno tablet worden gebruikt?**

U moet de voorgeschreven kuur altijd afmaken. De klachten waarvoor u wordt behandeld, kunnen terugkomen als u de kuur niet afmaakt.

Als de klachten niet over zijn na een behandeling kan deze worden herhaald.

Wat u moet doen wanneer u meer van Canesten gyno tablet heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer er teveel van Canesten gyno tablet is gebruikt.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Canesten gyno tablet te gebruiken

Wanneer u bent vergeten Canesten gyno tablet te gebruiken kunt u de normale dosering op het volgende tijdstip van gebruik toepassen. Gebruik geen dubbele hoeveelheid Canesten gyno tablet om zo de vergeten doses in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Canesten gyno tablet

Het is belangrijk om de behandeling af te maken. Als u te vroeg stopt met de behandeling is het mogelijk dat de schimmelinfectie weer terugkomt.

Algemeen

De partner dient bij infectie van de penis behandeld te worden met een anti-schimmel-crème om besmetting wederzijds te voorkomen.

Bij hardnekkige infecties moet gedacht worden aan een mogelijke besmetting via het rectum, dat dan behandeld moet worden.

De tabletten hebben vocht in de vagina nodig om geheel te kunnen oplossen. Onopgeloste delen van de tablet kunnen uit de vagina worden uitgescheiden. Om dit te voorkomen is het belangrijk de tablet zo diep mogelijk in de vagina in te brengen, vóór het slapen gaan. Indien de tablet niet in één nacht oplost, kan overwogen worden om een clotrimazol bevattende crème te gebruiken.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten gyno tablet bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bij gebruik van Canesten gyno *tablet* kan in een enkel geval een ernstigere overgevoeligheidsreactie optreden. In dat geval kunnen naast huidklachten, zoals jeuk,

roodheid en een branderig gevoel ook andere bijwerkingen voorkomen, zoals kortademigheid, lage bloeddruk, flauwte, misselijkheid en diarree.

Bij de partner kan irritatie van de penis optreden.

Met onbekende frequentie wordt vaginaal bloedverlies gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CANESTEN GYNO TABLET?

- Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen!
- Bewaar dit geneesmiddel in de originele verpakking.
- Gebruik Canesten gyno tablet niet meer na de vervaldatum die staat op het vouwdoosje en op de strip (bij de tablet) achter de letters EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Canesten gyno tablet

Het werkzame bestanddeel is clotrimazol.

De andere bestanddelen zijn:

Calciumlactaat (E327), colloïdaal siliciumdioxide (E551), crospovidon (E1202), lactose, magnesiumstearaat (E470B), maïszetmeel, melkzuur (E270), microkristallijne cellulose (E460 (i)), hypromellose (E464).

Hoe ziet Canesten gyno tablet eruit en de inhoud van de verpakking

Canesten gyno tablet is verkrijgbaar in een verpakking met 6 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

Voor *inlichtingen*: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht.

Fabrikant: Bayer AG, Leverkusen, Duitsland.

Canesten gyno tablet, tablet voor vaginaal gebruik, is in het register ingeschreven onder RVG 06517.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2021