

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**

### **CLARELUX 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik in spuitbus (Clobetasolpropionaat)**

#### **Lees de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is CLARELUX en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. WAT IS CLARELUX EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

CLARELUX bevat de werkzame stof clobetasolpropionaat dat behoort tot een groep van geneesmiddelen die topische corticosteroiden worden genoemd. Clobetasolpropionaat is een zeer krachtig topisch (op de huid werkend) corticosteroïde (bijnierschorsormoon).

CLARELUX 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik in spuitbus is een schuim dat wordt aangebracht op de huid

CLARELUX 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik in spuitbus wordt gebruikt als een kortdurende behandeling van ziektes van de hoofdhuid, zoals psoriasis, die gevoelig zijn voor steroïden, maar die niet goed reageren op minder actieve steroïden.

### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

#### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- Als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
- Als u een infectieuze huidaandoening heeft, veroorzaakt door een virus (bv. herpes, gordelroos, waterpokken, enz.), een bacterie (bv. impetigo, enz.), een schimmel (veroorzaakt door microscopische schimmels) of parasieten;
- Als u brandwonden, zwerende laesies of andere huidaandoeningen heeft zoals rosacea, acne, huidontsteking rond de mond, jeuk (pruritus) rond de anus of de genitaliën;
- Op elke plek van uw lichaam of aangezicht (inclusief de oogleden), behalve uw hoofdhuid.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Stop de behandeling onmiddellijk en neem contact op met uw arts als een allergische reactie optreedt; de tekenen daarvan kunnen bestaan uit huiduitslag, jeuk of een pijnloze zwelling van weefsel (oedeem).

Zoals met alle lokale corticosteroïden kan CLARELUX opgenomen worden door de huid en bijwerkingen veroorzaken, zoals bijnieronderdrukking – zie rubriek 4 voor alle mogelijke bijwerkingen. Daarom:

- dient u een langetermijnbehandeling met dit middel te vermijden.
- mag dit middel niet aangebracht worden op een grote oppervlakte.
- mogen de behandelde plekken niet gezwachteld of bedekt worden tenzij onder toezicht van uw arts.
- wordt het gebruik van dit middel op wonden of zweren niet aanbevolen.
- neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.

### **Raadpleeg uw arts:**

- Als uw aandoening niet verbetert na 2 weken behandeling.
- Als u een infectie krijgt, omdat het kan dat de behandeling met dit middel moet worden stopgezet.
- Als u problemen begint te ondervinden met uw zicht, aangezien dit type van geneesmiddel de ontwikkeling van het vertroebelen van de ooglens (cataract) en verhoogde oogbldruk (glaucoom) kan bevorderen.

Was uw handen zorgvuldig na elk gebruik.

Bij toevallig contact met het gezicht of de ogen, zorgvuldig spoelen met veel water.

### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Behandeling wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast CLARELUX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding, tenzij uw arts dit adviseert.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Dit middel zou geen invloed mogen hebben op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

### **Belangrijke informatie over enkele ingrediënten in CLARELUX**

Dit geneesmiddel bevat:

- 2145 mg alcohol (ethanol) bij elke toepassing, dat een branderig gevoel kan veroorzaken op een beschadigde inhoud.
- 74 mg propyleenglycol bij elke toepassing.

- cetyl- en stearylalcohol wat plaatselijke huidreacties kan veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

### 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

#### WAARSCHUWINGEN:

**De bus bevat een onder druk staande, brandbare vloeistof.**

**Niet gebruiken of bewaren in de buurt van open vuur, ontstekingsbron, warmte genererend materiaal of elektrisch apparaat in gebruik.**

**Niet roken tijdens het gebruiken of vasthouden van deze bus.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Gebruik dit geneesmiddel uitsluitend voor de aandoening waarvoor het werd voorgeschreven. CLARELUX mag uitsluitend worden aangebracht op de hoofdhuid en mag niet worden ingeslikt.

Rechtstreeks op de handen spuiten wordt afgeraden, daar het schuim onmiddellijk begint op te lossen bij contact met warme huid.


Breng CLARELUX aan op de aangetaste plek op de hoofdhuid **tweemaal daags, één keer in de ochtend en één keer 's avonds**, volgens de volgende instructies:

**Let op: Om het schuim goed te kunnen verdelen, is het belangrijk de spuitbus op zijn kop te houden!**

1. De bus goed schudden.



2. Keer de bus **om** en spuit een kleine hoeveelheid (ter grootte van een walnoot) ofwel rechtstreeks op de hoofdhuid, ofwel in de dop van de bus, op een schotel of ander koel oppervlak en dan op de hoofdhuid. Clarelux dient altijd dun te worden aangebracht, dus gebruik zo weinig mogelijk om de aangetaste plekken te bedekken. De exacte hoeveelheid die u nodig heeft, hangt af van de grootte van de aangetaste plek. Niet aanbrengen op de oogleden en vermijd contact met ogen, neus en mond. Spuit CLARELUX niet op uw handen, daar het schuim onmiddellijk begint op te lossen bij contact met warme huid.



3. Strijk het haar weg van het schuim en masseer voorzichtig in de hoofdhuid tot het schuim verdwijnt en is geabsorbeerd. Herhaal indien nodig, om de hele aangetaste plek te behandelen.



Was uw handen na het aanbrengen van CLARELUX en gooi ongebruikt schuim weg. Gebruik CLARELUX niet op uw aangezicht. Als er per ongeluk wat schuim in uw ogen, neus of mond komt, onmiddellijk spoelen met koud water. Het kan prikken. Neem contact op met uw arts als de pijn aanhoudt.

De behandelde plekken mogen niet gezwachteld of bedekt worden tenzij uw arts dit adviseert.

De behandelde hoofdhuid niet onmiddellijk wassen of afspoelen na het aanbrengen van CLARELUX.

Gebruik niet meer dan 50 g CLARELUX schuim per week.

De behandeling mag niet langer dan 2 weken gegeven worden. Na deze periode kan CLARELUX soms worden gebruikt indien nodig. Als alternatief kan uw arts een zwakker steroïd voorschrijven om uw aandoening onder controle te houden.

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u:

- meer van dit middel heeft aangebracht dan de voorgeschreven dosis
- dit middel langer heeft gebruikt dan op uw voorschrift staat

#### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Gebruik het zodra u het eraan denkt, doe dan verder zoals voordien. Als u er pas aan denkt op het tijdstip van uw volgende dosis, gebruik dan een enkele dosis en ga verder zoals voordien (breng geen dubbele dosis aan om de vergeten dosis in te halen). Als u meerdere doses hebt gemist, informeer dan uw arts.

#### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Stop het gebruik van dit middel niet plotseling daar dit schadelijk kan zijn voor u. Uw arts moet de behandeling mogelijks geleidelijk stoppen en het is mogelijk dat u regelmatige controles nodig hebt.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van CLARELUX 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts als overgevoeligheidsreacties zich voordoen, zoals lokale irritatie.

De bijwerkingen kunnen omvatten:

### **Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)**

- Brandend gevoel
- Andere huidreacties wanneer het wordt aangebracht op de huid

### **Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)**

- Tintelend of prikkelend gevoel
- Oogirritatie
- Gezwollen aders
- Huidirritatie en gevoelige huid
- Trekkende huid
- Jeukende huiduitslag (contactdermatitis)
- Verergerde schilferende huiduitslag (verergerde psoriasis)
- Roodheid op de toedieningsplaats
- Jeuk en soms pijn op de toedieningsplaats
- Aanwezigheid van bloed, eiwit en stikstof in uw urine kan opgespoord worden door een arts

### **Bijkomende bijwerkingen kunnen omvatten:**

- Veranderingen in haargroei (abnormale haargroei weg van de toedieningsplaats en op ongewone delen van het lichaam)
- Veranderingen in huidkleur
- Irritatie van de haarfollikels, b.v. pijn, warmte en roodheid
- Monduitslag
- Roodheid en uitslag op het aangezicht
- Trage wondheling
- Effecten op de ogen, zoals vertroebeling van de ooglenzen (cataract) en verhoogde oogdruk
- Wazig zien

### **Bijwerkingen veroorzaakt door langdurig gebruik:**

- Witte striemen op de huid (striae) en verwijding van de bloedvaten van de huid
- Zoals met andere lokale corticosteroiden kan CLARELUX, wanneer het in grote hoeveelheden en gedurende een lange periode wordt gebruikt, leiden tot een stoornis die Syndroom van Cushing wordt genoemd. De symptomen omvatten een rood, opgezwollen en rond aangezicht (een maangezicht genoemd), hoge bloeddruk, gewichtstoename en veranderingen in suikerwaarden in het bloed en de urine.
- Door langdurige behandeling met steroïden kan de huid dunner worden.

In zeldzame gevallen kan de behandeling van psoriasis met corticosteroiden (of bij het stopzetten van de behandeling) de aandoening verergeren en een pustuleuze vorm van de ziekte kan voorkomen. Bij het stopzetten van de behandeling met corticosteroiden kan de hoofdhuidaandoening soms terugkeren. Ook eerder bestaande infecties kunnen verergeren als CLARELUX niet volgens de instructies wordt gebruikt.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

- **De bus bevat een onder druk staande, brandbare vloeistof.**
- **Niet bewaren in de buurt van open vuur, ontstekingsbron, warmte genererend materiaal of elektrisch apparaat in gebruik.**
- **Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C of aan direct zonlicht.**
- **De bus niet doorboren of verbranden, ook al is hij leeg.**
- **Na afloop van de behandeling dient de bus op een veilige manier opgeruimd te worden.**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de bus en de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren. Rechtopstaand bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. . Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stof in dit middel is clobetasolpropionaat en 1 g schuim voor cutaan gebruik bevat 500 microgram clobetasolpropionaat.

De andere stoffen in dit middel zijn: ethanol watervrij, gezuiverd water, propyleenglycol, cetylalcohol, stearylalcohol, polysorbaat 60, citroenzuur watervrij, kaliumcitraat en een propaan/*n*-butaan/isobutaan drijfgas.

### **Hoe ziet CLARELUX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

CLARELUX 500 microgram/g schuim voor cutaan gebruik is een wit schuim voor cutaan gebruik in spuitbus. Elke bus bevat 50 of 100 gram.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

Pierre Fabre Benelux  
Henri-Joseph Genessestraat 1,  
1070 Brussel  
België

*Fabrikant*

Recipharm Uppsala AB  
Björkgatan 30  
753 23 Uppsala  
Zweden

Of

Farmol Health Care S.r.L.  
Via del Maglio, 6  
23868 Valmadrera (LC), Italy

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**  
RVG 30096

**Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:**

België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen,  
Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk:

CLARELUX

Italië:

OLUX

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2020.**