



BIJSLUITER

FOLIUMZUUR 2,5 mg tablet

Lees de hele bijsluiter goed vóóordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij een tekort aan Foliuzuur in het lichaam door gebrek aan deze vitamine, bij bepaalde vormen van bloedarmoede en bij de stofwisselingsziekte homocystinurie. Ook wordt het gebruikt om bijwerkingen van het geneesmiddel methotrexaat te verminderen.

Foliuzuur (vitamine B11) is in het lichaam nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen en voor de werking van de zenuwen.

2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

- Als u allergisch of overgevoelig bent voor Foliuzuur of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Als u bloedarmoede heeft door een tekort aan vitamine B12 (pernicieuze anemie).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast FOLIUMZUUR 2,5 mg tabletten nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.

Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen:

- capecitabine en fluorouracil. Foliumzuur in doseringen van meer dan 5mg per dag kan de bijwerkingen van deze medicijnen versterken.
- fenytoïne. Foliumzuur in doseringen van meer dan 1mg per dag kan de werking van fenytoïne verminderen.
- methotrexaat. Foliumzuur kan de werking van methotrexaat verminderen. Als u Foliumzuur gebruikt om bijwerkingen van methotrexaat te verminderen, moet u dit minimaal 24 uur na de inname van methotrexaat nemen.

Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Voor het gebruik van alcohol zijn bij dit geneesmiddel geen beperkingen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? U kunt dit geneesmiddel veilig gebruiken in de gebruikelijke dosering.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken is niet te verwachten.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen (homocystinurie met chronische nierfunctiestoornis): 1 tot 5 mg per dag

Kinderen vanaf 5 jaar (chronische hemolyse): 3 maal per week 1 tablet.

Wijze van innemen:

Neem FOLIUMZUUR 2,5 mg tabletten met vloeistof, bijvoorbeeld water, in.

Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?

Als u teveel FOLIUMZUUR 2,5 mg tabletten heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?

Als u een dosis bent vergeten te gebruiken dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel

Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de arts heeft aangegeven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn:

- allergische reactie, zoals huiduitslag, galbulten, jeuk en koorts

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer gebruikt.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is Foliumzuur.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn carboxymethylzetmeel, microkristallijne cellulose, lactose, magnesiumstearaat en siliciumdioxide.

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

FOLIUMZUUR 2,5 mg tabletten zijn lichtgele, ronde tabletten en 9 millimeter in doorsnee; ze hebben aan één kant een inscriptie.

De tabletten zijn verpakt per 500 stuks in tablettencontainer met schroefdop.

Fabrikant:

GMP Apotheek De Magistrale Bereider
A. van Leeuwenhoekstraat 16
3261 LT Oud-Beijerland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012.