BIJSLUITER

GLYCOPYRRONIUM BROMIDE 1 mg tabletten

Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Glycopyrronium en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Glycopyrronium en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij overmatige speekselvloed, bijvoorbeeld bij mensen met de ziekte van Parkinson. Er kan dan sprake zijn van speekselvloed door moeite met slikken en moeite om de mond te sluiten.
Glycopyrronium is een anticholinergicum, het remt de werking van een lichaamseigen stof ('acetylcholine'). Acetylcholine beïnvloedt verschillende organen in het lichaam, zoals blaas, darmen, longen, de iris in het oog en de speekselklieren.

Heeft u andere ziektebeelden? Vraag uw arts uitleg waarom hij dit geneesmiddel voorschrijft.

2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u een darmziekte heeft waarbij een gedeelte van de darm is vernauwd of waarbij de darmen niet meer vanzelf samentrekken.
  Als u moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat.
  Als u een verhoogde oogboldruk heeft, die niet wordt behandeld.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?
- Als u hartvaatklachten heeft, zoals hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, hartfalen of pijn op de borst. Dit geneesmiddel kan de hartslag vertragen.
- Als u koorts heeft of als het in uw omgeving erg warm is. Dit geneesmiddel zorgt ervoor dat u minder zweet, waardoor u sneller oververhit kunt raken.
- Als u een nierfunctiestoornis heeft. Een aanpassing van de dosis kan nodig zijn.
- Als u een maagzweer of slokdarmontsteking heeft. U kunt meer last krijgen van opkomend maagzuur.
- Als u myasthenia gravis (ernstige spierzwakte) heeft.
- Als u droge ogen heeft, bijvoorbeeld door de ziekte van Sjögren. U kunt meer last van droge ogen krijgen.
- Bij kinderen jonger dan 1 jaar, kinderen met het syndroom van Down en kinderen met hersenschade, omdat zij extra gevoelig kunnen zijn voor de bijwerkingen van dit geneesmiddel.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast GLYCOPYRRONIUM BROMIDE 1 mg tabletten nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden nog gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen of voedingssupplementen die u zonder voorschrift kunt kopen.

Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen:
- Bepaalde geneesmiddelen tegen psychose of depressie. Deze geneesmiddelen kunnen de effecten van Glycopyrronium versterken.
- Amantadine (geneesmiddel bij de ziekte van Parkinson). Dit geneesmiddel kan bepaalde bijwerkingen van Glycopyrronium versterken, zoals duizeligheid, slaperigheid, opwinding en verwardheid.
- Pilocarpine (geneesmiddel tegen verhoogde druk in het oog en tegen een droge mond).
- Cisapride, domperidon en metoclopramide. Glycopyrronium kan de werking van deze geneesmiddelen verminderen.
- Geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer, zoals rivastigmine.
- Geneesmiddelen bij myasthenia gravis (neostigmine, pyridostigmine, distigmine).

Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent, vooral tijdens de eerste weken van de behandeling. Wees daarom voorzichtig met alcohol in de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Glycopyrronium kan soms sufheid, verminderd gezichtsvermogen of duizeligheid veroorzaken. Houdt u hiermee rekening bij het autorijden of het bedienen van machines.

GLYCOPYRRONIUM BROMIDE 1 mg tabletten bevatten lactose
Als uw arts u heeft meegedeeld dat u deze stof niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen: 3 keer per dag 1 tablet van 1 mg.

Wijze van innemen:
Neem GLYCOPYRRONIUM BROMIDE 1 mg tabletten tijdens, net na een maaltijd of met wat voedsel in. U vermindert daarmee de kans op maagklachten.

Neem GLYCOPYRRONIUM BROMIDE 1 mg tabletten met vloeistof, bijvoorbeeld water, in.

Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?
Als u teveel GLYCOPYRRONIUM BROMIDE 1 mg tabletten heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bijwerkingen die dan kunnen ontstaan, zijn maag-darmklachten, hartkloppingen en oververhitting. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken, neem de dosis alsnog zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de arts heeft aangegeven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn:
- Maag-darmklachten, zoals misselijkheid en verstopping.
- Droge mond, smaakverlies.
- Hartkloppingen, blozen, duizeligheid.
- Wazig zien, last hebben van fel licht.
- Niet kunnen zweten, rode, warme en droge huid.
- Niet goed kunnen plassen.
- Slaperigheid, sufheid, slapte, duizeligheid.
- Slapeloosheid, opwinding, verwardheid.
- Verhoogde oogboldruk; raadpleeg een arts bij plotselinge stekende pijn achter het oog.
- Allergische reactie, zoals huiduitslag, galbulten of benauwdheid.

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen:
- Paradoxale opwinding, vooral bij jonge kinderen.
- Hartritmestoornissen, hartstilstand.
- Hoge of lage bloeddruk.
- Epileptische aanvallen (convulsies).
- Ademhalingsstilstand

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van een van de bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Het melden van bijwerkingen draagt bij aan de veiligheid van geneesmiddelen.

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?
- De werkzame stof in dit geneesmiddel is Glycopyrronium bromide.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn calciumwaterstoffosfaat, lactose monohydraat, magnesiumstearaat, natriumzetmeelglycolaat en polyvenylpyrrolidon.

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
GLYCOPYRRONIUM BROMIDE 1 mg tabletten zijn witte, rond tabletten en 6 millimeter in doorsnee.

De tabletten zijn verpakt per 90 stuks in een tablettencontainer met schroefdop.

Fabrikant:
GMP Apotheek De Magistrale Bereider
Benjamin Franklinstraat 9
3261 LW Oud-Beijerland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in augustus 2016 door GMP Apotheek De Magistrale Bereider.

Dit geneesmiddel is gemaakt door GMP Apotheek De Magistrale Bereider en betreft een in Nederland niet-geregistreerde sterkte van dit geneesmiddel. Een geregistreerd geneesmiddel verdient altijd de voorkeur boven een niet-geregistreerd geneesmiddel. In dit geval is geen geregistreerde sterkte van dit geneesmiddel beschikbaar voor de behandeling die uw arts heeft voorgeschreven, daarom is voor u dit geneesmiddel in de apotheek bereid. Dit geneesmiddel voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die ook voor geregistreerde geneesmiddelen gelden.