

## KNMP-standpunt over het niet langer vergoeden van (doorgeleverde) bereidingen per middel

### PEDIATRIE

Recepten voor kinderen leiden nogal eens tot een bereiding 'op maat' in de apotheek. Vaak zijn de middelen die worden voorgeschreven alleen geregistreerd voor gebruik bij volwassenen. De vorm of sterkte van een handelsproduct is dan niet geschikt voor kinderen. Voor kinderen gelden niet alleen andere doseringen dan bij volwassenen, ook bij de keuze van hulpstoffen moet men rekening houden met verschillen. Deze worden bijvoorbeeld veroorzaakt doordat het metabolisme bij kinderen afwijkt van dat bij volwassenen.

#### **Amlodipine 1 mg caspules**

Argumentatie verzekeraars: *Off-label bij hypertensie.*

##### Reactie KNMP

Deze lagere sterkte wordt gebruikt voor de behandeling van hypertensie bij kinderen vanaf 1 maand. (<https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/407/amlodipine>). Het argument dat het off-label is, is welliswaar correct, maar deze lijn doortrekkend, zou dit betekenen dat er voor kinderen helemaal geen geneesmiddelen meer worden vergoed.

#### **Diclofenac NA en syrpend SF PH4 kit 5 mg/ml**

Argumentatie verzekeraars: *Niet rationeel.*

##### Reactie KNMP

Het NSAID diclofenac wordt in deze vorm gegeven bij kinderen met pijn, ontstekingsactiviteit en koorts bij Juvenile Idiopathische Arthritis (JIA). Vloeibare toedieningsvormen zijn voornamelijk geschikt voor jonge kinderen die (nog) niet goed de orale medicatie in vaste vorm kunnen doorslikken. Daarnaast hebben dranken het belangrijke voordeel dat de flexibiliteit in doseren groter is.

#### **Griseofulvine 25 mg/ml**

#### **Griseofulvine tablet 125 mg**

Argumentatie verzekeraars: *Op 'N' vanwege kans op ernstige bijwerking.*

##### Reactie KNMP

Griseofulvine wordt toegepast bij tinea capitis veroorzaakt door *Microsporum canis* bij kinderen. De kans op bijwerkingen staat los van de vergoedingsstatus.

#### **Triamcinolonacetonide 0,02%; 0,05% creme**

Argumentatie verzekeraars: *De 0,1% dunner smeren.*

##### Reactie KNMP

De lagere concentraties zijn nodig bij kinderen. Daarbij werkt de Finger Tip Unit instructie niet meer als er 'dunner' moet worden gesmeerd. FTU is de hoeveelheid die wordt weergegeven als 'vingertopstreepje'. Deze is gelijk aan een streepje crème of zalf dat net zo

lang is als het vingertopje van een volwassene. Hoeveel vingertopstreepjes er nodig zijn, hangt af van het in te smeren lichaamsdeel. Als er te dun wordt gesmeerd, wordt het therapeutische effect van de basis gemist.

## PSYCHIATRIE

Thuiswonende (ernstig) psychiatrische patiënten krijgen hun medicatie vaak in een medicijnrol. Het is sterk af te raden om deze kwetsbare groep zelf de medicatie te laten halveren en een half tabletje te laten bewaren.

### **Oxazepam 25 mg**

Argumentatie verzekeraars: *Niet rationeel qua prijs.*

#### Reactie KNMP

De halve sterkte van een tablet van oxazepam 50 mg wordt toegepast in de medicijnrol en gezien de B2-indicatie is het onwenselijk om met name die patiënten zelf een hele tablet te laten halveren.

## ZIEKENHUISVERPLAATSTE ZORG

Meer en meer, en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen, vindt 'ziekenhuiszorg' plaats in de thuissituatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor palliatieve zorg, maar ook voor patiënten die een blaasspoeling ondergaan.

### **Bupivacaïne/sufentanil INF (diverse sterkten en leveranciers)**

### **Bupivacaine/morfine inf en cass (diverse sterkten en leveranciers)**

Argumentatie verzekeraars: *Niet bedoeld voor extramuraal gebruik, puur anesthesie.*

#### Reactie KNMP

Een combinatie van een lokaal anestheticum bupivacaïne en een opioïd wordt vaak toegepast wanneer de analgetische werking van de toegediende opioïden onvoldoende is. Dit preparaat wordt niet louter voor anesthesie gebruikt.

### **Oxybutynine blaasspoeling 1 mg/ml; 0,2 mg/ml**

Argumentatie verzekeraars: *Rationaliteit blijkt niet uit de literatuur. Alleen na voorafgaande machtiging.*

#### Reactie KNMP

Diverse wetenschappelijk artikelen onderbouwen de rationaliteit van oxybutynine blaasspoelingen.

Enkele referenties:

1. Krause P, Fuhr U, Schnitker J, Albrecht U, Stein R, Rubenwolf P. *Pharmacokinetics of intravesical versus oral oxybutynin in healthy adults: results of an open label, randomized, prospective clinical study.* J Urol. 2013;190:1791-7.
2. Verpoorten C et al, *The neurogenic bladder: medical treatment.* Pediatr Nephrol 2008; 23,717-25.
3. Dawson TE, Jamison J. *Intravesical treatments for painful bladder syndrome/ interstitial cystitis.* Cochrane Database Syst Rev. 2007;4:CD006113.
4. Guerrero K, Emery S, Owen L, Rowlands M. *Intravesical oxybutynin: practicalities of clinical use.* J Obstet Gynaecol. 2006;26:141-3.

### **Azijnzuurwondspoeling**

Argumentatie verzekeraar: *Wordt gebruikt bij door pseudomonas geïnfecteerde wonden. Wordt intramuraal gebruikt.*

#### Reactie KNMP

De behandeling van deze wonden vindt, door ziekenhuisverplaatste zorg, steeds meer in de thuissituatie plaats.

## OVERGEHEVELDE MIDDELEN

### **ACES-TG tablet 10mg; 20 mg**

Argumentatie verzekeraars: *Rationele therapie, maar vanaf 1-1-2015 ziekenhuisbudget.*

#### Reactie KNMP

Tioguanine 40 mg (Lanvis), geregistreerd voor de behandeling van acute myeloïde leukemie, acute lymfatische leukemie en chronische myeloïde leukemie, is per 1 januari 2015, zoals alle overige oncolgische middelen, overgeheveld naar ziekenhuisbudget. ACES TG (10 en 20 mg) wordt echter niet gebruikt voor de behandeling van een oncologische aandoening maar voor de behandeling van inflammatoire darmziekten. VWS beraadt zich nog of het thioguaninepreparaat dat wordt ingezet voor de behandeling van inflammatoire darmziekten buiten de 1-1-2015 overheveling valt.

## OOGDRUPPELS

### **Dexamethason/chlooramfenicol/polymixine oogdruppels**

Argumentatie verzekeraars: *FK zegt dat deze combinatie zelden geïndiceerd is.*

#### Reactie KNMP

Een klein aantal patiënten heeft wel degelijk baat bij deze oogdruppels. Dat een indicatie zeldzaam is, vormt geen rationele reden om niet te vergoeden.

## OORDRUPPELS

### **Chlorampoldex oordruppels**

### **Dexamethason/chlooramfenicol/polymixine oordruppels**

### **Prednisolon/neomycine oordruppels**

Argumentatie verzekeraars: *FK zegt bij een vergelijkbaar combipreparaat (panotile): De combinatiepreparaten van een antimicrobieel middel met een corticosteroïd hebben geen plaats bij de behandeling van acute otitis externa.*

#### Reactie KNMP

De combinatie van een corticosteroïd met een antimicrobieel middel in oordruppels is soms geïndiceerd voor kortdurend gebruik bij chronische otitis media. Deze oordruppels vinden verder toepassing bij chirurgische ingrepen aan het middenoor, bij post-traumatische aandoeningen en in sommige gevallen van otitis externa waarbij een conservatieve behandeling onvoldoende effectief is. Tevens is dit preparaat een goed alternatief gebleken

bij beschikbaarheidsproblemen met Bacicoline B (BACITRACINE/COLISTINE/HYDROCORTISON) die de afgelopen jaren met enige regelmaat zijn voorgekomen.

## ZALVEN, CRÈMES EN LOTIONS

Voor de werking van dermatica is de basis van even groot belang als de keuze van de werkzame stof. Dit verklaart de verscheidenheid aan basispreparaten waarin werkzame stoffen worden verwerkt.

### **Azelainezuur crème 20% (al dan niet met TCA 0,1%)**

Argumentatie verzekeraars: *Niet beoordeeld door FK en er zijn alternatieven. Daarnaast risico op substitutie bij hyperpigmentatie. Valt in dezelfde categorie als hydrochinon. Is een derdekeusmiddel.*

#### Reactie KNMP

De NHG Farmacotherapeutische Richtlijn Rosacea stelt dat azelainezuurcrème, naast metronidazolcrème, een plaats heeft in de behandeling van papulopustuleuze rosacea. Dit is een eerste keus middel bij de behandeling van rosacea.

**Betamethason 0,1%/ketoconazol 2% crème**  
**Clindamycine 1%/TCA 0,1% crème/lotion/zalf**  
**Fusidinezuur 2%/TCA 0,1%/ miconazol 2% crème**  
**HCA 1%/ketoconazol 2% crème**  
**Ketoconazol 2%/ HCA 1% diverse basiscrème/zalf**  
**TCA 0,1 %/ miconazol 2% crème/zalf**  
**TCA 0,1%/ fusidinezuur 2% (crème/zalf)**

Gegeven argumentatie  
Rationaliteit staat niet vast.

#### Reactie KNMP

Deze combinatie wordt toegepast voor kortdurende behandeling van schimmelinfecties van de huid die erg jeukt, rood ziet of pijn doet. Dit preparaat is vergelijkbaar met het vergoede middel Daktacort creme/zalf.

### **Tretinoïne crème (diverse sterkten) crème/lotion**

Argumentatie verzekeraars: *Wordt gebruikt voor hyperpigmentatie en acne.*

#### Reactie KNMP

Lokale retinoïden zijn eerste keus bij acne met overwegend comedonen, maar zijn ook effectief bij papels en pustels. Tretinoïne is in Nederland al langer bekend, adapaleen is een nieuw retinoïde dat even effectief lijkt en mogelijk een iets gunstiger bijwerkingenprofiel heeft. De voorkeur gaat uit naar tretinoïne omdat daarmee meer ervaring is opgedaan (NHG-standaard Acne). Terecht worden Differin (adapaleen) alsook Acid A vit creme (tretinoïne creme 0,05%) wel vergoed.

### **Triamcinolacetonide (vaseline)crème 0,1%**

Argumentatie verzekeraars: *Deze ontbreekt.*

#### Reactie KNMP

Triamcinolonacetonide wordt cutaan toegepast bij inflammatoire aandoeningen. Voor de werking is de basis van even groot belang als de keuze van de werkzame stof. Het is onduidelijk waarom triamcinolonacetonide in een andere basis (vergelijkbaar met de triamcinolonacetonidevaselinecreme) niet vergoed wordt.

#### **Ureumcreme (diverse sterkten en basiscrèmes)**

Argumentatie verzekeraars: *Alle producten op N. Veel crèmes en zalven met ureum zijn OTC.*

#### Reactie KNMP

Calmurid (10% ureum) is geregistreerd voor ichthyosis, hyperkeratotische huid en in huidpreparaten ter verbetering van de penetratie van corticosteroiden. Calmurid (HC) creme wordt vergoed. Ureum 5% wordt toegepast bij kinderen. Voor de werking is de basis van even groot belang als de keuze van de werkzame stof. Dit verklaart de verschillende basispreparaten die worden gebruikt. Ureum 40%-preparaten worden toegepast bij de behandeling van zwarte haartong.

#### **Nystatine crème 100.000 IE/G crème/zalf**

Argumentatie verzekeraars: *Deze ontbreekt.*

#### Reactie KNMP

Nystatine cutaan is tweede keus bij de behandeling van candida albicans indien een imidazoolpreparaat niet effectief is.

#### **Podofylline collodium 5%; 20%; 25%**

Argumentatie verzekeraars: *Intramuraal.*

#### Reactie KNMP

Podofylline collodium wordt toegepast bij genitale wratten. De behandeling kan zowel in het ziekenhuis als in de eerste lijn plaatsvinden.

## ANALOGIE BIJLAGE 2

#### **Docusaat klysma 1 mg/ml**

Argumentatie verzekeraars: *Analoog aan Klyx = OTC.*

#### Reactie KNMP

Preparaten die naar analogie onder dezelfde voorwaarde van bijlage 2 vallen als de geregistreerde geneesmiddelen (35. Laxantia, docusaat klysma) moeten op dezelfde worden behandeld.

## THERAPIE OVERIGE

#### **Temazepam druppels 30 mg/ml**

Argumentatie verzekeraars: *De gelpcapsules kunnen ook rectaal worden ingebracht in de terminale fase. De druppels zijn niet rationeel.*

#### Reactie KNMP

In de laatste levensfase is het rectaal toedienen van de geneesmiddel zeer belastend waardoor rectaal inbrengen afgeraden is. Daarnaast bestaat er voor het rectaal toedienen van gelcapsules geen onderbouwing. De laatste, kleine, studies dateren uit 1996. Hieruit werd geconcludeerd dat *“the commercially available liquid-filled capsule is less suitable for rectal administration”*. (Pharmacy World & Science 1996; 18:114-9).

#### **Dehydroepiandrosteron tablet 25 mg**

Argumentatie verzekeraars: *Wordt uitsluitend vergoed door een zorgverzekeraar na toestemming/machtiging.*

#### Reactie KNMP

Dehydroepiandrosteron (prasteron) wordt ter versterking van het immuunsysteem bij lupus erythematodes, HIV-infectie en aids toegepast. In plaats van een N moet er een code voor machtiging komen.

#### **Kaliumjodide**

Argumentatie verzekeraars: *Is gezien de indicatie (ter voorbereiding van strumectomie, thyrotoxische crisis, schildklierblokkade) bij therapie met radioactief jodium tweedelijns middel.*

#### Reactie KNMP

Voorafgaand aan de strumectomie moet de patiënt 50 tot 250 mg driemaal per dag, gedurende 10–14 dagen nemen. De patiënt neemt deze tabletten wel degelijk in de thuissituatie en dus niet in het ziekenhuis.

#### **Prednison tablet 2,5 mg; 20 mg; 30 mg; 50 mg**

Argumentatie verzekeraars: *Er kan worden uitgeweken naar prednisolon tablet.*

#### Reactie KNMP

Prednisolon en prednison zijn gelijkwaardige producten. Het is aan de voorschrijver of prednison meerwaarde heeft ten opzichte van prednisolon.

#### **Salicylzuur (diverse sterkten en basiscrème/zalf)**

Argumentatie verzekeraars: OTC-middelen, salicylzuur zit in veel zelfzorgmiddelen

#### Reactie KNMP

De vergoedingsstatus wordt bepaald door de indicatie. Veel preparaten met salicylzuur worden toegepast bij psoriasis. Zie NHG Standaard Psoriasis, stap 0. Psoriasis is geen zelfzorgaandoening.

## HULPSTOFFEN/ HALFFABRIKATEN

#### **Solutio Natrii hydroxidi diluta 2N**

Argumentatie verzekeraars: *Alleen hulpstof.*

Reactie KNMP

Wanneer een hulpstof niet wordt vergoed, worden ook preparaten waarin deze hulpstof is verwerkt, niet meer vergoed. Solutio Natrii hydroxidi diluta 2N wordt gebruikt bij de bereiding van theofyllineklysma FNA.

**Hypromellose-benzalkoniumoplossing FNA**

Argumentatie verzekeraars: *Deze ontbreekt.*

Reactie KNMP

Hypromellose-benzalkoniumoplossing wordt toegevoegd als hulpstof in oogdruppels, voor verlengde verblijftijd in oog. Wanneer dit bestanddeel niet wordt vergoed, worden oogdruppels die vanwege een verlengde verblijftijd in deze oplossing worden voorgeschreven, ook niet meer vergoed.